



Weespersluis - ondersteuning ecologie

Quickscan ecologie - Sluislocatie

GEM Bloemdalerpolder CV

4 juni 2019

Witteveen + Bos

Els Linde

Project Weespersluis - ondersteuning ecologie
Opdrachtgever GEM Bloemdalerpolder CV

Document Quickscan ecologie - Sluislocatie
Status Definitief
Datum 4 juni 2019
Referentie 114259/19-009.411

Projectcode 114259
Projectleider mevrouw 5.1.2e MSc
Projectdirecteur ir. 5.1.2e

Auteur(s) 5.1.2e BSc en 5.1.2e (Els & Linde)
Gecontroleerd door mevrouw 5.1.2e
Goedgekeurd door mevrouw 5.1.2e MSc

Paraaf

5.1.2e

Adres Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7400 AE Deventer
+ 5.1.2e
www.witteveenbos.com
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Doel	6
1.3	Leeswijzer	6
2	PLANGEBIED & VOORNEMEN	7
2.1	Beschrijving plangebied	7
2.2	Beschrijving voornemen	8
3	TOETSINGSKADER	9
3.2	NNN	11
4	GEBIEDSBESCHERMING	13
4.1	Natura 2000 (Wnb)	13
4.1.1	Gegevens	13
4.1.2	Effecten & conclusie	15
4.2	NNN	16
4.3	Gegevens	16
4.4	Effecten & conclusie	16
5	SOORTENBESCHERMING	17
5.1	Methode	17
5.2	Resultaten per soortgroep	17
5.2.1	Flora	17
5.2.2	Grondgebonden zoogdieren	18
5.2.3	Vleermuizen	19
5.2.4	Vogels	20
5.2.5	Amfibieën en reptielen	21
5.2.6	Vissen	23
5.2.7	Vlinders; libellen en andere ongewervelden	23

6	SAMENVATTING	25
6.1	Effecten op beschermde gebieden	25
6.1.1	Natura 2000 (Wnb)	25
6.1.2	NNN	25
6.2	Effecten op beschermde soorten	25
6.3	Nodige vervolgstappen	28

7	LITERATUUR	29
---	-------------------	----

	Laatste pagina	29
--	----------------	----


	Bijlage(n)	Aantal pagina's
I	IHD Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer	3
II	IHD Natura 2000-gebied Naardermeer	3
III	IHD Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen	4

INLEIDING

1.1 Aanleiding

In de Bloemendalerpolder wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, genaamd 'Weespersluis'. Weespersluis wordt een ruim woonlandschap voor 2.750 woningen en wordt aangelegd in de gemeente Weesp. In het kader van dit ontwikkelingsproject, zijn reeds twee ontheffingen voor de Wet natuurbescherming (Wnb) aangevraagd en goedgekeurd. Het gaat enerzijds om een ontheffing voor de realisatie van de woningen binnen het plangebied en anderzijds een ontheffing voor uitvoering van de natuurcompensatie (RUD17.213991 en RUD17.222616). De begrenzing van de percelen die binnen deze genoemde ontheffingen vallen, sluiten echter niet geheel op elkaar aan. Een aantal locaties waar in het kader van dit ontwikkelingsproject werkzaamheden gaan plaatsvinden, zoals sluisstructuren en ontsluitingswegen, vallen daarmee buiten de begrenzing van de goedgekeurde ontheffingen. Het betreft in totaal zeven locaties (afbeelding 1.1). Voor deze locaties wordt daarom een grenscorrectie van de bestaande ontheffingen aangevraagd. In het kader van deze aanvraag is inzicht nodig in de aanwezige beschermde natuurwaarden op ieder van deze locaties en de mogelijk negatieve effecten hierop als gevolg van het voornemen. Deze informatie wordt achterhaald middels een ecologische quickscan. Onderliggend document betreft de quickscan voor **Sluislocatie**.

Afbeelding 1.1 Overzicht van de zeven locaties waarvoor een ecologische quickscan wordt opgesteld in het kader van de grenscorrectie van ontheffingen



1.2 Doel

Het doel van deze quickscan is om te toetsen:

- welke effecten de werkzaamheden hebben op:
 - beschermde gebieden (Natura 2000) in het kader van de Wnb;
 - beschermde soorten in het kader van de Wnb;
 - het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
- wat de consequenties van deze mogelijke effecten zijn in het kader van de natuurwetgeving en het natuurbeleid (ontheffings- en/of vergunningaanvraag in combinatie met mitigerende/compenserende maatregelen).

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de planlocatie en de geplande werkzaamheden. Hoofdstuk 3 beschrijft het toetsingskader in relatie tot de natuurwet- en regelgeving. Hoofdstuk 4 en 5 betreffen de effectenbeoordeling voor gebiedsbescherming (hoofdstuk 4) en soortenbescherming (hoofdstuk 5). Hierin wordt nagegaan welke beschermde natuurwaarden in en nabij de planlocatie aanwezig zijn en wat de effecten van het voornemen hierop zijn. Hoofdstuk 6 betreft een overzicht van de belangrijkste conclusies uit deze ecologische quickscan. In hoofdstuk 7 is ten slotte de geraadpleegde literatuur weergegeven.


2

PLANGEBIED & VOORNEMEN

2.1 Beschrijving plangebied

Het plangebied voor de woonwijkontwikkeling is gelegen in de gemeente Weesp in de provincie Noord-Holland. De planlocatie Sluislocatie, onderwerp van deze quickscan, bevindt zich aan de oostkant van de Bloemendalerpolder, direct grenzend aan de Vecht. De locatie valt gedeeltelijk buiten de ontheffingen (RUD17.213991 en RUD17.222616). Voor de locatie wordt een grenscorrectie van de bestaande ontheffingen aangevraagd.

Afbeelding 2.1 Topografische kaart en begrenzing van het planlocatie



De oppervlakte van het terrein is 45.976 m² bestaat voor het overgrote deel uit grasland. Het perceel is in agrarisch beheer. Er staat een gemaal en een woonhuis binnen het perceel. Langs de Vecht ligt een lage dijk. De oeverbegroeiing van de Vecht is niet goed ontwikkeld. Tijdens het veldbezoek werd de dijk begraasd met paarden. Ten zuidwesten langs het perceel loopt de Molentocht, die als afwatering naar de Vecht functioneert. Op de oever van de Vecht staat een gemaal.

Hieronder worden enkele foto's van de planlocatie getoond (afbeelding 2.2).

Afbeelding 2.2 Impressie omgeving de planlocatie en omgeving



2.2 Beschrijving voornemen

Het geplande voornemen betreft het graven van een vaarverbinding tussen de Vecht en de nieuwe woonwijk. Het gemaal en het woonhuis zullen daarvoor gesloopt worden. Er komt een tijdelijke woning binnen de locatie. Vooralsnog komt er geen horeca, als dat in de toekomst wenselijk is, dan wordt hiervoor een aparte ontheffing aangevraagd.

TOETSINGSKADER

3.1 Wnb

3.1.1 Gebiedsbescherming

In hoofdstuk 2 van de Wnb zijn de bepalingen voor gebiedsbescherming vastgelegd. De regels hebben als doel het beschermen en in stand houden van natuurgebieden met bijzondere of kwetsbare waarden. Hiermee zijn internationale verplichtingen uit de Vogelrichtlijn (VR) en Habitatrichtlijn (HR), maar ook verdragen als bijvoorbeeld het Verdrag van Ramsar (Wetlands) in nationale regelgeving verankerd.

Nederland past een vergunningstelsel toe bij de bescherming van Natura 2000-gebieden. Projecten of andere handelingen, die gelet op de instandhoudingdoelen (IHD), verslechterende of significant verstorende gevolgen kunnen hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied, zijn volgens artikel 2.7, lid 2 van de Wnb vergunningplichtig. Voor elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden beoordeeld of kan worden uitgesloten dat de werkzaamheden/ontwikkeling een significant negatief effect hebben op de beschermde natuurwaarden in het betreffende gebied. Indien significant negatieve effecten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, dient een 'passende beoordeling' te worden uitgevoerd. Kunnen dergelijke significante effecten wel worden uitgesloten, maar kan er wel enige verslechtering plaatsvinden, dan is een verslechteringstoets vereist.

In het geval de passende beoordeling niet de zekerheid verschaft dat er geen sprake is van een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied, moet de vergunning, c.q. de instemming, worden geweigerd, tenzij aan de 'ADC-criteria' voldaan wordt. Dit betekent dat er geen alternatieven zijn (A), er sprake is van bij de wet genoemd belang (D) en dat door compensatie de algehele samenhang van het Natura 2000-netwerk gewaarborgd blijft (C).

Effecten op Natura 2000-gebieden worden beoordeeld aan de hand van de IHD die in de aanwijzingsbesluiten voor de betreffende gebieden zijn vastgesteld. IHD betreffen zowel habitattypen als habitat- en vogelsoorten. In het kader van de alternatievenafweging wordt beoordeeld of er onderscheid is in de mate waarin de verschillende alternatieven effect hebben op de IHD en of er voor de verschillende alternatieven de kans bestaat dat significant negatieve effecten optreden.

3.1.2 Soortenbescherming

Onder de Wnb bestaat de soortenbescherming uit drie beschermingsregimes: een beschermingsregime voor VR-soorten (artikel 3.1), HR-soorten (artikel 3.5) en 'andere soorten' (artikel 3.10). Voor ieder van deze regimes gelden afzonderlijke verbodsbepalingen. In de navolgende paragrafen worden de verbodsbepalingen waaraan getoetst wordt, toegelicht.

VR-soorten

Het beschermingsregime voor VR-soorten heeft betrekking op de soorten zoals aangeduid in artikel 1 van de VR. Dit betreft alle van nature in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied.

Voor vogelsoorten gelden de volgende verbodsbepalingen (Wnb artikel 3.1, lid 1 tot en met 4):

- het is verboden opzettelijk vogels te doden of te vagen;
- het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten weg te nemen;
- het is verboden eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
- het is verboden vogels opzettelijk te storen.

Het laatste verbod is echter niet aan de orde indien kan worden onderbouwd dat de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (Wnb artikel 3.1, lid 5). Het bepalen of sprake is van een wezenlijke invloed is per soort en per situatie maatwerk.

De meeste vogelsoorten maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de hiervoor beschreven verbodsbepalingen van de Wnb. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen deze nesten worden verwijderd of verplaatst, tenzij in specifieke situaties er een ecologisch zwaarwegend belang is om nesten die normaliter niet jaarrond beschermd zijn toch jaarrond te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer door een ingreep een groot deel van de nestgelegenheid van een bepaalde populatie dreigt te verdwijnen. Voor het verstoren van vogels (in het broedseizoen) is het verkrijgen van een ontheffing in principe niet mogelijk omdat bijna altijd een alternatief voorhanden is, namelijk werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn. De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is.

De verbodsbepalingen van de Wnb zijn altijd relevant voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Jaarrond beschermde nesten zijn er in 4 verschillende categorieën:

- 1 nesten die buiten het broedseizoen worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld: steenuil);
- 2 nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);
- 3 nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing (bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
- 4 vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (bijvoorbeeld boomvalk, buizerd en ransuil).

HR-soorten

Het beschermingsregime voor HR-soorten heeft betrekking op in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de HR, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn. De verbodsbepaling voor planten heeft betrekking op soorten (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) uit bijlage IV, onderdeel b, bij de HR of bijlage I bij het Verdrag van Bern.

Voor deze dieren en planten van de HR gelden de volgende verbodsbepalingen (Wnb artikel 3.5, lid 1 tot en met 5):

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden dieren opzettelijk te verstoren;
- het is verboden eieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
- het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden planten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Als deze verbodsbepalingen voor deze soorten worden overtreden, moet een ontheffing van de Wet natuurbescherming worden aangevraagd.

'Andere soorten'

Het beschermingsregime voor de 'andere soorten' heeft betrekking op de soorten uit bijlage A en B bij de Wnb. Hierin zijn lijsten met overige plant- en diersoorten opgenomen die, buiten de VR- en HR om, nationaal beschermd worden.

Voor deze soorten gelden de volgende Verbodsbepalingen (Wnb artikel 3.10, lid 1a tot en met 1c):

- het is verboden dieren opzettelijk te doden of te vangen;
- het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen;
- het is verboden vaatplanten opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Binnen de soortenlijsten in bijlage A en B bij de Wnb is geen onderscheid gemaakt tussen licht en zwaar beschermde soorten. Zowel het Ministerie van LNV als de provincies zijn bevoegd om binnen deze lijsten soorten aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of waarvoor aangepaste voorwaarden gelden in het geval van een ontheffingsaanvraag.

Als er sprake is van een overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van deze soorten is een ontheffing van de Wnb nodig.

Zorgplicht

In artikel 1.11 lid 1 en lid 2 van de Wnb is de zorgplicht beschreven: 'Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor in het wild levende dieren en hun directe leefomgeving. Een ieder laat handelingen na, waarvan redelijkerwijs te vermoeden is, dat ze nadelig zijn voor in het wild levende dieren. Als dat nalaten in redelijkheid niet geveerd kan worden, dienen de gevolgen van dat handelen voor die dieren zoveel mogelijk voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt te worden'. De zorgplicht geldt altijd.

3.2 NNN

Het NNN is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Door natuur te verbinden blijft diversiteit behouden en verkleint de kans op uitsterven van soorten.

Begrenzing en wezenlijke kenmerken en waarden

De wezenlijke kenmerken en waarden van een NNN-gebied zijn van belang bij het bepalen of ruimtelijke initiatieven doorgang kunnen vinden. In het beginsel geldt de regel dat geen bestemmingswijzigingen mogelijk zijn als daardoor de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied (per saldo) significant worden aangetast. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast, moet het bevoegd gezag erop toezien dat hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken heeft de provincie de te behouden wezenlijke kenmerken en waarden per gebied gespecificeerd in het Natuurbeheerplan.

Nee-tenzij principe

Het NNN wordt beschermd op grond van de Provinciale Omgevingsverordening Noord-Holland. Deze verordening kent geen bepalingen ten aanzien van externe werking (buiten de begrenzing van het NNN-gebied). De regels ter bescherming van het NNN staan in artikel 2.7.3 van het provinciaal blad. Bestemmingsplannen die betrekking hebben op gebieden aangeduid als NNN wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die activiteiten mogelijk maken die leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang tussen die gebieden.

Bij nieuwe ontwikkelingen in het NNN moet getoetst worden of er sprake is van significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Of een activiteit een significante invloed heeft op de wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende gebied is afhankelijk van de soort bedrijvigheid, de plek in het NNN-gebied en de natuurwaarden ter plaatse. Wordt significante aantasting aangetoond, dan is de ontwikkeling niet mogelijk, tenzij er sprake is van:

- een groot openbaar belang;
- er geen reële andere mogelijkheden zijn; en

- de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden gecompenseerd waarbij:
 - de compensatie niet mag leiden tot een nettoverlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de wezenlijke kenmerken en waarden; en
 - de compensatie plaatsvindt.

4


GEBIEDSBESCHERMING

4.1 Natura 2000 (Wnb)

4.1.1 Gegevens

In de ruimere omgeving van de planlocatie bevinden zich verschillende beschermde natuurgebieden behorend tot het Natura 2000-netwerk. Het betreft de gebieden 'Markermeer & IJmeer', op een afstand van circa 1 km ten noorden van de planlocatie, het 'Naardermeer', gelegen circa 3 km ten zuidoosten van de planlocatie en de 'Oostelijke Vechtplassen' op een afstand van 7 km ten zuiden van de planlocatie. Overige Natura 2000-gebieden bevinden zich op een afstand van meer dan 8 km vanaf de planlocatie. Als gevolg van deze afstand en de tussenliggende barrières (uitgestrekt agrarisch gebied, grote autowegen, et cetera) zijn negatieve effecten op deze gebieden als gevolg van geplande werkzaamheden bij voorbaat uit te sluiten. In onderliggende paragrafen wordt daarom enkel ingegaan op de effecten van het voornemen op de Natura 2000-gebieden 'Markermeer & IJmeer', 'Naardermeer' en 'Oostelijke vechtplassen'. Onderstaande tabel geeft een beschrijving van deze Natura 2000-gebieden en de bijhorende instandhoudingsdoelen (IHD) [lit. 1].

Afbeelding 4.1 Ligging van Natura 2000-gebieden in de omgeving van de planlocatie (rode cirkel)



Markermeer & IJmeer

Het gebied 'Markermeer & IJmeer' werd in 2010 definitief aangewezen als VR- en HR-gebied (VR+HR) van het Natura 2000-netwerk in Nederland.

Het Markermeer (met het IJmeer) is een groot, ondiep zoetwatermeer dat wordt begrensd door dijken en dammen. Een belangrijk verschil met het IJsselmeer is de slibrijke bodem en de geringere diepte, die er voor zorgt dat dit slib gemakkelijk door de wind wordt opgewerveld, zodat het meer gemiddeld troebeler is. Toch foerageren ook hier grote aantallen watervogels, in het bijzonder viseters en eters van bodemfauna. In heldere delen, zoals de Gouwe en de kust van Muiden, komen goed ontwikkelde kranswierbegroeiingen voor, waarop krooneenden foerageren.

Het gebied is aangewezen voor twee habitattypen, drie habitatsoorten, twee broedvogelsoorten en 19 niet-broedvogelsoorten. Een volledig overzicht van de aangewezen typen en soorten en de bijhorende instandhoudingsdoelen (IHD) is opgenomen in bijlage I.

Naardermeer

Het Naardermeer werd in 2013 definitief aangewezen als VR- en HR-gebied van het Natura 2000-netwerk in Nederland.

Het Naardermeer is een natuurlijk meer op de overgang van een glaciële stuwwal naar het laaggelegen zeekleilandschap. Door verlanding van het meer is een gevarieerd mozaïek ontstaan van natte bossen, rietlanden, veen mosrietlanden en open water met waterplanten. Het gebied is van groot belang voor moerasvogels als Grote karekiet en Purperreiger. Een groot deel van de omliggende polders is in de afgelopen jaren omgevormd tot natte, open moerasgebieden, die grote aantallen watervogels en steltlopers herbergen.

Het gebied is aangewezen voor tien habitattypen, zes habitatsoorten, vijf broedvogelsoorten en twee niet-broedvogelsoorten. Een volledig overzicht van de aangewezen typen en soorten en de bijhorende instandhoudingsdoelen (IHD) is opgenomen in bijlage II.

Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen is een gebied dat in 2013 definitief werd aangewezen als VR- en habitatrichtlijngebied van het Natura 2000-netwerk in Nederland.

De Oostelijke Vechtplassen bestaan uit een reeks van laagveengebieden op de grens van Noord-Holland en Utrecht, tussen de Vecht en de Utrechtse Heuvelrug. Het veen in het gebied is op veel plaatsen vergraven, waardoor een afwisseling van land en water is ontstaan met grote plassen, sloten, rietlanden en andere moerassen, graslanden en bossen. Van Europees belang zijn de begroeiingen van open water, restanten trilveen, de grote oppervlakte aan moerasbos, populaties van de Noordse woelmuis, grote aantallen foeragerende vleermuizen en diverse water- en moerasvogels. Samen met de Wieden en Weerribben behoort het gebied tot de belangrijkste laagveenmoerassen van ons land.

Het gebied is aangewezen voor tien habitattypen, elf habitatsoorten, negen broedvogelsoorten en acht niet-broedvogelsoorten. Een volledig overzicht van de aangewezen typen en soorten en de bijhorende instandhoudingsdoelen (IHD) is opgenomen in bijlage III.

In de directe omgeving van de planlocatie (0 tot 5 km) is één habitatype aanwezig waarvoor binnen de genoemde Natura 2000-gebieden IHD gelden en die in de huidige situatie reeds te maken heeft met een overbelasting door stikstof. Het gaat om het habitat 'meren met krabbenscheer en fonteinkruiden' (H3150). Dit habitatype is te vinden vanaf een afstand van circa 3 km ten oosten van de planlocatie voor de woonwijkontwikkeling.

Verder kan de planlocatie deel uitmaken van het leefgebied van verschillende soortenpopulaties van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Zo is het niet uit te sluiten dat de (niet-)broedvogelsoorten waarvoor binnen de Natura 2000-gebieden IHD gelden, ook gebruik maken van het de planlocatie als onderdeel van

hun foerageergebied. Zo vormen de graslanden en sloten in het broedseizoen een foerageergebied voor kleine aantallen purperreigers uit het nabijgelegen Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. In de wintermaanden vormen de graslanden geschikt foerageergebied voor de aangewezen niet-broedvogels kleine zwaan, kolgans, brandgans en grauwe gans.

4.1.2 Effecten & conclusie

Directe effecten

De werkzaamheden binnen de sluislocatie vinden plaats buiten de contouren van de Natura 2000-gebieden. Hierdoor zijn directe effecten zoals oppervlakteverlies van habitattypen of leefgebieden van soorten binnen de Natura 2000-gebieden uitgesloten. Een aantal van de aangewezen soorten van deze Natura 2000-gebieden maken echter ook gebruik van zones buiten het Natura 2000-gebied als onderdeel van hun leefgebied. Zo biedt het plangebied, en ook de hier beschouwde planlocatie, mogelijk foerageergebied voor verschillende aangewezen (niet-)broedvogels. Als gevolg van de het voornemen verdwijnt (tijdelijk) een deel van deze graslanden geschikt als foerageergebied. Op veel kortere afstand van de Natura 2000-gebieden is echter een groot areaal aan vergelijkbare alsook beter geschikte (agrarische) foerageergebieden aanwezig, zoals de recent gerealiseerde foerageerzones rond het Naardermeer. De niet te bebouwen delen van het plangebied bieden bovendien potenties voor nieuwe foerageergebieden voor deze soorten. Van een significante negatief effect op de populaties van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van oppervlakteverlies is gezien het bovenstaande dan ook geen sprake.

Naast oppervlakteverlies dienen ook versturende effecten te worden beschouwd. Zowel in de aanleg- als in de gebruiksfase is sprake van een (beperkte) verstoring in en nabij de planlocatie door geluid, licht en/of trillingen. Deze aspecten kunnen zorgen voor een verstoring van soorten waarvoor binnen de nabijgelegen Natura 2000-gebieden IHD gelden. Het bereik van deze verstoringaspecten is echter beperkt. Verstoring in de aanlegfase door bijvoorbeeld trillingen treedt zeer lokaal op. Doorgaans reikt dit effect enkele tientallen meters (tot circa 50 m) van de trillingsbron en neemt dit vervolgens zeer snel af zodat effecten op enkele honderden meters van de bron nagenoeg niet meer voelbaar zijn. Dergelijke effecten reiken daarmee niet tot binnen de grenzen van de Natura 2000-gebieden. Significante negatieve effecten op de aanwezige soorten als gevolg van de beperkt bijkomende verstoring is daarmee uit te sluiten.

Indirecte effecten

Indirect kunnen de geplande werkzaamheden een negatief effect hebben op aanwezige habitattypen van de Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename in stikstofdepositie. De nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor een aantal stikstofgevoelige habitats zoals kranswierwateren en meren met krabbenscheer. In de aanlegfase worden werkzaamheden voor de aanleg van het woongebied mogelijk uitgevoerd met stikstof emitterend materieel, zoals diverse (mobiele) werktuigen en voertuigen. De depositietoename in zowel de aanleg- als de gebruiksfase kunnen leiden tot een (tijdelijke) toename in stikstofdepositie in de omgeving van de planlocatie. Het optreden van verzuring en vermisting binnen de nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissie van de geplande werkzaamheden kan daarmee niet worden uitgesloten. In de directe nabijheid (0- 3km) van het plangebied voor de woongebied ontwikkeling bevinden zich tevens habitats die matig tot zeer gevoelig zijn voor deze aspecten. Om inzicht te verkrijgen in het effect van de voorgenomen werkzaamheden op de nabijgelegen stikstofgevoelige habitattypen, is daarom in een eerder fase van het project een stikstofdepositie-onderzoek uitgevoerd aan de hand van de AERIUS-Calculator [lit. 2]. De resultaten van deze berekening geven aan dat het plan Bloemendalerpolder leidt tot een (sterke) afname van de stikstofdepositie op de daarvoor gevoelige habitats in de omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van de afname van het agrarisch gebruik in dit gebied. Alleen op het habitat H6410 Blauwgraslanden in het Naardermeer is het effect neutraal. Negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie kunnen daardoor geheel worden uitgesloten.

Conclusie

Voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase geldt dat significant negatieve effecten (zowel direct als indirect) als gevolg van het voornemen op voorhand zijn uit te sluiten. De goede instandhouding van de aangewezen


habitattypen en soorten van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden komen niet in het gedrang. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.

4.2 NNN

4.3 Gegevens

Ten oosten grenst de planlocatie direct aan een smalle NNN-zone (oeverzone van de Vecht). Op een afstand van circa 80 m ten oosten van de planlocatie ligt ook een NNN-zone (afbeelding 4.2).

Afbeelding 4.2 NNN zones in de nabijheid van de planlocatie



4.4 Effecten & conclusie

De planlocatie ligt direct grenzend (ten westen) aan een smalle zone behorend tot het NNN. Daarnaast ligt er een NNN-zone op iets grotere afstand ten oosten van de planlocatie. Van ruimtebeslag is geen sprake. In de provincie Noord-Holland kent de bescherming van het NNN geen externe werking. Doordat de werkzaamheden niet plaatsvinden binnen gebieden die behoren tot het NNN, zijn significante negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN hier uitgesloten. Vervolgstappen zijn niet nodig.

SOORTENBESCHERMING

5.1 Methode

Om de aanwezigheid van beschermde Flora en Fauna in of rondom de planlocatie vast te kunnen stellen is een bureaustudie en een soortgericht veldonderzoek uitgevoerd. De bureaustudie bestond uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Aanvullend hierop zijn, als daar aanleiding voor was, verspreidingsatlassen, internetbronnen en de op internet vrij verkrijgbare verspreidingsgegevens geraadpleegd. Ter verificatie van en als aanvulling op de bureaustudie is door een ecooloog van Els & Linde een soortgericht veldbezoek uitgevoerd in de periode april-mei 2019. Hierbij werd een globale habitatscan uitgevoerd en werden toevallige waarnemingen van soorten genoteerd.

Op basis van de biotoopeisen van beschermde soorten, de resultaten van de bureaustudie en het veldbezoek is bepaald of beschermde soorten leefgebied kunnen vinden in en nabij de planlocatie en of daar nader onderzoek voor nodig is. Aan de hand van de geplande werkzaamheden en de verstoringsgevoeligheid van soorten is vervolgens bepaald of negatieve effecten kunnen optreden, en of er sprake is van een overtreding van de Wnb.

5.2 Resultaten per soortgroep

5.2.1 Flora

Bureaustudie

Op basis van de NDFF-database [lit. 4] zijn in de afgelopen tien jaar in de nabijheid van de planlocatie geen waarnemingen bekend van onder de Wnb-beschermde Flora.

De meeste onder de Wnb-beschermde Flora zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam en komen voor in zeer specifieke biotopen. Voorbeelden van biotopen waar onder de Wnb-beschermde Flora lokaal kunnen voorkomen zijn loof- en naaldbossen, hakhout en struwelen op kalkrijke, humeuze, vrij voedselarme, compacte en lemige bodems. Ook in heiden en borstelgraslanden en in onbemeste riet- en hooilanden, leemrijke akker (vooral onder wintergraan), op rivierduintjes, in kalkgraslanden en lemige blauwgraslanden, in duinvalleien en soms in het winterbed van rivieren komen de soorten voor. Daarnaast zijn er enkele soorten specifiek gebonden aan stenig substraat. Deze soorten zijn te vinden op rotsen, puinhellingen en oude (kalkrijke) muren.

Veldbezoek

Onder de Wnb-beschermde Flora zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen. Deze worden binnen de planlocatie ook niet verwacht.

Binnen het perceel is voornamelijk algemeen voorkomende gras- en kruidenvegetatie aanwezig. Plaatselijk is een dominantie van gestreepte witbol aanwezig. De oevervegetatie bestaat ook uit algemene soorten. De aangetroffen soorten indiceren voedselrijke omstandigheden. De aanwezigheid van onder de Wnb-beschermde planten kan zodoende worden uitgesloten.

Effecten & conclusies

Het voorkomen van onder de Wnb-beschermd flora in en rond de planlocatie is als gevolg van de afwezigheid van geschikt biotoop uit te sluiten. Hierdoor zijn negatieve effecten op beschermde plantensoorten uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht.

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Bureau studie

Op basis van de NDFF-database zijn in de omgeving van het planlocatie in de afgelopen tien jaar waarnemingen bekend van verschillende algemeen voorkomende zoogdiersoorten zoals woelmuizen, haas en ree. Voor het verstoren van deze bijlage A-soorten geldt binnen de provincie Noord-Holland een algemene vrijstelling. Daarnaast zijn enkele waarnemingen bekend van wezel, hermelijn en bunzing bekend uit de Bloemendalerpolder. Deze soorten staan momenteel niet op de lijst van vrijgestelde soorten. Dit omdat de gunstige staat van instandhouding van deze soorten onvoldoende vaststaat.

De biotoopeisen van de relevante soorten zijn in onderstaand kader beschreven [lit. 5].

Wezel

Wezels leven bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap maar verder in veel verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland). Meestal in droger gebied dan de hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken, ontbreekt ook de wezel. Ze zoeken graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages, houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak oude hollen van muizen, ratten en konijnen die bekleed wordt met veren of haren van prooidieren. Goede schuilmogelijkheden en de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn omgeving stelt.

Hermelijn

De hermelijn komt in alle habitats voor, van open plekken, in bossen, houtwallen, duinen, akkers, vochtig terrein,... De enige voorwaarde is dat er voldoende dekking aanwezig is. De soort is dan ook aanwezig in heel het vasteland van Nederland en op Texel. De hermelijn leeft in een hol, meestal een oud mollenest of konijnenhol en verplaatst zich meestal langs lijnvormige elementen die dekking bieden zoals heggen, muurtjes, oeverlijnen, et cetera. Ook maakt hij hierbij geregeld gebruik van hollen van andere dieren. Een hol of gang moet een doorsnede hebben van 5 cm.

Bunzing

De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, maar zijn voorkeur gaat uit naar een kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden en water in de buurt. Dit kunnen oeverbegroeiingen, droge sloten, heggen, houtwallen, bosranden en akkerranden zijn, maar ook meer waterrijke gebieden zoals rietvelden of moerasgebieden. Daarnaast komt hij ook voor in vrij open terreinen, zoals weidegebieden met sloten. Vooral in de winter komt de bunzing ook wel in de buurt van boerderijen voor: daar kunnen ze tussen stobalen en op hooizolders warm blijven, en muizen en ratten bemachtigen.

In 2017 is in het plangebied voor de woonwijkontwikkeling een soortgericht onderzoek uitgevoerd naar deze drie martersoorten [lit. 6]. Voor dit onderzoek werden sporenbuizen uitgezet en is een morzella geplaatst. Alle middelen lagen in het pitrusveld of in de bosrand. Op basis van dit onderzoek werd in 2017 de aanwezigheid van wezel binnen/nabij de planlocatie aangetoond.

Veldbezoek

De omgeving van de planlocatie vormt een geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren zoals haas (open graslanden), konijn, egel (ruig grasland) en verschillende soorten muizen en spitsmuizen. Voor deze soorten geldt binnen de provincie Noord-Holland een vrijstelling voor artikel 3.10 van de Wnb (doden van dieren of beschadigen/vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen) in het kader van ruimtelijke ingrepen.

Op de dijk langs de Vecht zijn gedurende vier weken, in totaal zijn zes buizen voor wezel/hermelijn en zes buizen voor de bunzing uitgezet. In één van de sporenbuizen zijn prenten van de wezel waargenomen. Hermelijn en bunzing of sporen van deze soorten werden niet waargenomen tijdens het onderzoek. In de Bloemendalerpolder zijn deze soorten wel waargenomen. De Vechtdijk grenzend aan het plangebied vormt geschikt habitat voor deze soorten.

Effecten & conclusies

Het voorkomen van verschillende algemeen voorkomende grondgebonden zoogdiersoorten (bijlage A Wnb) binnen de planlocatie is op basis van aanwezige biotopen en ligging niet uit te sluiten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling voor artikel 3.10 van de Wnb (doden van dieren of beschadigen/vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen) in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ingrepen. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten is niet nodig. Wel is te allen tijde de zorgplicht van kracht.

In de nabijheid van het plangebied is ook het voorkomen van wezel, hermelijn en bunzing niet uit te sluiten. Binnen de planlocatie zelf is de wezel aangetoond. Door de aanwezigheid van voldoende beschutting is het voorkomen van essentieel leefgebied van deze soorten binnen de grenzen van de planlocatie niet uit te sluiten. Het weiland is slechts suboptimaal voor de marters. De dijk wordt alleen bij het gemaal doorgestoken c.q. de doorsteek wordt verbreed. Een vernietiging van essentieel leefgebied als gevolg van het geplande voornemen is dan ook niet aan de orde. De soorten hebben voldoende mogelijkheden om (tijdelijk) uit te wijken in het geval van verstoring. Er blijft tijdens (aanlegfase) en na afloop van de werkzaamheden (gebruiksfase) voldoende foerageergebied beschikbaar voor deze soorten. Er is geen sprake van aantasting van de functionaliteit van het gebied voor deze soorten als gevolg van de werkzaamheden. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn nodig.

5.2.3 Vleermuizen

Bureaustudie

Op basis van de NDFF-database zijn in de afgelopen tien jaar in de nabijheid van de planlocatie geen waarnemingen bekend van vleermuizen. Emond en Brandjes (2014) hebben in een eerder stadium de gehele Bloemendalerpolder geïnventariseerd. In het gebouw aan het eind van de molentocht is destijds een paarverblijf van laatvlieger aangetroffen.

Veldbezoek

De planlocatie vormt mogelijk (matig) geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Het zeer open karakter van het landschap en het gebrek aan luwte maakt het plangebied minder geschikt. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de planlocatie zo nu en dan wordt gebruikt (afhankelijk van het weer) door vleermuizen. De Vecht en haar oevers vormt een doorlopend lijnvormig element door het landschap en vormt vermoedelijk een vliegroute voor meerdere vleermuissoorten.

Omdat het gebouw aan het eind van de molentocht wel potentie heeft als verblijfplaats voor vleermuizen (Emond en Brandjes 2014), is in 2018 een vleermuisonderzoek uitgevoerd conform Vleermuisprotocol 2017. Tijdens de inventarisatie op 20 augustus 2018 zijn tegen middernacht sociale geluiden van de laatvlieger gehoord. De waarneming van medio augustus is een bevestiging van de waarnemingen uit 2014.

Effecten & conclusies

Vlieg- en foerageergebied

Van een essentieel onderdeel van het leefgebied voor vleermuizen is geen sprake. Ook van potentiële vliegroutes is binnen de grenzen van de planlocatie geen sprake. Een aantasting van essentieel vlieg- of foerageergebied als gevolg van het voornemen is niet aan de orde. Vervolgstappen ten aanzien van de Wnb zijn niet nodig. Wel geldt de zorgplicht.

In het kader van de zorgplicht dienen alle maatregelen te worden genomen die in alle redelijkheid kunnen worden verwacht om verstoring van dieren te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Er wordt daarom aanbevolen om de werkzaamheden in de mate van het mogelijke uit te voeren buiten de actieve periode voor vleermuizen, bij daglicht (tussen een uur na zonsopkomst en een uur voor zonsondergang) en bij voorkeur in de winterperiode (december -februari). Waar verlichting nodig is (zowel in de aanleg- als in de gebruiksfase) wordt aanbevolen gebruik te maken van efficiënt lichtbeheer. Met name door:

- gebruik te maken van vleermuisvriendelijke verlichting;
- het kunstmatig licht enkel daar te richten waar het ook daadwerkelijk nodig is (doelgericht) en dit zo te doen dat deze weg van het foerageergebied of de migratieroute schijnt;
- gebruikt te maken van armaturen die het licht door middel van een scherpe bundel één bepaalde kant en weg van het foerageergebied of de migratieroute, op richten;
- gebruik te maken van aangepaste armaturen die verstrooiing van licht minimaliseren;
- het aantal lampen, de lichtintensiteit en het gebruik van hoge lichtmasten met veel lichtverstrooiing te beperken;
- voor en na de werkzaamheden het gebruik van kunstverlichting te beperken tot enkel verlichting ter beveiliging van opslagterreinen. Ook hiervoor gelden de bovenvermelde restricties.

Verblijfplaatsen

Binnen gebouw aan het eind van de molentocht is het voorkomen van een paarverblijfplaats van laatvlieger aangetoond. Het betreft een paarverblijf van de laatvlieger in de woning naast het gemaal. In het kader van het voornemen dient dit gebouw te worden gesloopt. Wanneer het gebouw wordt gesloopt kunnen potentieel rustende dieren in hun verblijfplaats worden verstoord of gedood, daarnaast wordt in dit geval een verblijfplaats vernietigd. Dit zijn overtredingen van respectievelijk artikel 3.5 lid 2, 1 en 4 van de Wnb. Een ontheffing van de Wnb is zodoende noodzakelijk. Door mitigerende maatregelen dient te worden voorkomen dat rustende dieren worden verstoord of gedood als gevolg van de sloop. Dit dient te worden beschreven in een activiteitenplan en vormt input voor de ontheffingsaanvraag.

Compensatie

In de nieuwbouw binnen de Bloemendalerpolder worden zeer ruim maatregelen genomen om de aanwezigheid van vleermuizen te bevoordelen. In iedere woning zijn c.q. worden vleermuisvoorzieningen opgenomen. Dat leidt tot een toename van vele mogelijkheden voor de vleermuizen, waaronder de laatvlieger. De eerste woningen zijn al opgeleverd zodat tegen de tijd dat het gemaal en het woonhuis gesloopt worden er al veel verblijfplaatsen functioneel aanwezig zijn. Er wordt daarom geen negatief effect verwacht van de sloop. Dit dient te worden beschreven in een activiteitenplan en vormt input voor de ontheffingsaanvraag.

5.2.4 Vogels

Bureaustudie

In de afgelopen tien jaar werden in de wijdere omgeving van de planlocatie verschillende algemeen voorkomende broedvogelsoorten waargenomen. Waarnemingen van jaarrond beschermde nesten zijn niet bekend.

Veldbezoek

Het open landschap van de planlocatie vormt potentieel geschikt leefgebied voor weidevogels. De oevers van de watergangen vormen geschikt broedgebied voor algemeen voorkomende watervogels zoals meerkoet.

Waarnemingen van soorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn, werden tijdens het veldbezoek niet gedaan. De buizerd en havik zijn bekend van de andere locaties binnen de Bloemendalerpolder. Nesten van deze soorten in of direct nabij de planlocatie werden niet vastgesteld. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten binnen of rondom de planlocatie kan worden uitgesloten.

Effecten & conclusies

Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen (artikel 3.1 Wnb). Delen van de planlocatie kunnen potentieel broedgebied vormen voor algemeen voorkomende (water)vogelsoorten. Binnen de planlocatie zijn geen jaar rond beschermde nesten aangetroffen en deze zijn hier ook niet te verwachten.

Werkzaamheden in het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli) kunnen leiden tot verstoring van broedende vogels in en nabij de planlocatie. Verstoring treedt op door aanwezigheid van mensen en materiaal, trillingen of geluid. Voor alle inheemse vogelsoorten geldt dat opzettelijk verstoren in het broedseizoen (individuen, nesten of eieren) en vernietigen van nesten verboden is volgens de Wnb. Het verkrijgen van ontheffing hiervoor is meestal niet mogelijk. De effecten op vogels en daarmee een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb zijn namelijk gemakkelijk te voorkomen, te weten door in principe drie mogelijkheden:

- buiten het broedseizoen werken, dit met risico dat sommige vogels tot in september kunnen broeden;
- de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken (werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stilleggen), zodat vogels niet gaan broeden in of nabij het gebied waar gewerkt wordt;
- (de omgeving van) het plangebied voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels.

Als werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, moet een deskundige vaststellen of er broedende vogels aanwezig zijn in of rondom de planlocatie. Wanneer wordt geconstateerd dat in de directe omgeving van de werkzaamheden geen vogels broeden bij de start van de werkzaamheden, vindt geen overtreding van de verbodsbepalingen plaats. In het geval dat er wel broedende vogels aanwezig zijn in of rondom de planlocatie, dient te worden bepaald of er verstoring plaatsvindt. Wanneer verstoring van wezenlijke invloed aan de orde is, zijn in sommige gevallen maatregelen mogelijk waardoor werkzaamheden (deels) kunnen door gaan. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld door binnen een ruime zone rondom het betreffende broedgeval (buiten de verstoringcontour) geen werkzaamheden te laten plaatsvinden. De grootte van de verstoringcontour is afhankelijk van de Vogelsoort. Wanneer verstoring van het broedgeval onvermijdelijk is, dan mag er pas worden gestart met de verstorende werkzaamheden als er niet meer gebroed wordt. Doorgaans zijn de meeste vogels rond half juli uitgebroed, er zijn echter Vogelsoorten die tot in september broeden.

5.2.5 Amfibieën en reptielen

Bureaustudie

Op basis van de NDFF-database [lit.] zijn in de afgelopen tien jaar in de Bloemendalerpolder waarnemingen bekend van twee onder de Wnb-beschermde amfibiesoorten. Het gaat om heikikker en rugstreeppad. Wat betreft reptielsoorten zijn in deze omgeving waarnemingen bekend van de ringslang. De ringslang werd waargenomen aan de westzijde van de Bloemendalerpolder. Overige onder de Wnb-beschermde reptielsoorten werden in de omgeving van de planlocatie in de afgelopen tien jaar niet waargenomen.

De biotooppeisen van deze soorten zijn in onderstaand kader beschreven [lit. 7].

Heikikker

De heikikker heeft een zeer duidelijke voorkeur voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. Ook wordt de soort gemeld uit bos en struweel, een belangrijke habitat voor de populaties uit de Vijfheerenlanden en het Kromme Rijngebied. De heikikker is duidelijk een cultuur vliedende soort die nauwelijks wordt aangetroffen in te intensief gebruikt agrarisch landschap, rond infrastructuur en bebouwing. De heikikker blijkt, in vergelijking tot bijvoorbeeld de bruine kikker, een vennensoort bij uitstek. Daarnaast komt de soort voor in kleine geïsoleerde wateren en in sloten (in laagveen, klei-op-veen en komkleigebieden). In rivier begeleidende wateren (kleiputjes) wordt de soort alleen langs de Nederrijn/Lek aangetroffen.

Rugstreepdad

De rugstreepdad komt voor in open, zandige gebieden zoals duinen, open rivieroever, stuifzanden en heidevelden. Ook op industrieterreinen, militaire oefenterreinen en in zandgroeven. Ze hebben een voorkeur voor dynamische milieus en verschijnen vaak als eerste in nieuw ontstane biotopen als afgravingen en opgespoten land. Een echte pionierssoort. Voor de voortplanting worden meestal ondiepe, vegetatiearme, tijdelijke kleine wateren gebruikt.

Ringslang

De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats. Deze liggen veelal op zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes laag gelegen, nat gebied worden gemeden, omdat de soort daar vaak niet alle stadia van zijn levenscyclus kan doorlopen. Met name de ontwikkeling van de eieren en de overwintering vormen in polders een probleem. Ringslangen zonnen vaak op dijken in de buurt van water, waar ze jagen op voornamelijk amfibieën en soms andere gewervelde dieren waaronder vissen.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb-beschermde amfibie- of reptielsoorten. De planlocatie vormt wel geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende amfibiesoorten zoals meerkikker en kleine watersalamander. Voor heikikker, rugstreepdad en ringslang is (op het moment) geen geschikt biotoop aanwezig. De rugstreepdad komt wel voor in de wijdere omgeving. In de uitvoeringsfase van de hier beschouwde werkzaamheden kan potentieel wel tijdelijk nieuw geschikt leefgebied voor rugstreepdaden wordt gecreëerd.

Effecten & conclusies

De aanwezigheid van algemeen voorkomende amfibiesoorten binnen de planlocatie zoals meerkikker en kleine watersalamander (beide bijlage A-soorten), is op basis van waarnemingen en de aanwezige biotoop aangrenzend aan de planlocatie niet uit te sluiten. Voor deze soorten geldt echter een vrijstelling voor artikel 3.10 van de Wnb (doden van dieren of beschadigen/vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen) in het kader van bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ingrepen. Wel geldt de zorgplicht.

Op basis van het aanwezige biotoop binnen en rondom de planlocatie kan de aanwezigheid van heikikker en ringslang worden uitgesloten. Dit geldt op het moment ook voor rugstreepdad. In de uitvoeringsfase van de hier beschouwde werkzaamheden kan er echter wel tijdelijk nieuw geschikt leefgebied voor rugstreepdaden wordt gecreëerd. Zo wordt de grond plaatselijk kaal gemaakt (open, vergraafbare bodem), vormen zich ondiepe poelen in de bandensporen van de werktuigen (voortplantingswater) en wordt werkmateriaal zoals hout en platen op het werktein opgeslagen (schuilplaatsen). De rugstreepdad is een zeer mobiele soort die makkelijk enkele kilometers om het huidige leefgebied kan opduiken op zoek naar dergelijke dynamische milieus. Wanneer rugstreepdaden het werkgebied betreden kan de soort als gevolg van de werkzaamheden worden verwond of gedood. Het verwonden of doden van individuen van de rugstreepdad is onder de Wnb verboden. Overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wnb is te voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan:

- het plaatsen van paddenschermen rond de meest kansrijke locaties voor het opduiken van de soorten (plastic scherm met hoogte van 50 cm boven grond en 10 cm onder grond) om te voorkomen dat heikikkers of rugstreepdaden het projectgebied gaan bevolken;
- plaatsen van emmers aan de binnenzijde van het paddenscherm om eventuele rugstreepdaden die binnen de begrenzing van de werkzaamheden aanwezig zijn op te vangen en te verplaatsen naar de andere kant van het scherm.

Deze maatregelen dienen uitgevoerd te worden onder begeleiding van een deskundig ecoloog. Mits deze maatregelen worden uitgevoerd is een ontheffing niet nodig.

5.2.6 Vissen

Bureaustudie

Volgens de NDFF-database zijn in de afgelopen tien jaar geen waarnemingen bekend van onder de Wnb-beschermden vissoorten in of nabij de planlocatie.

Binnen de HR zijn alleen de vissoorten houting en steur beschermd. Dit zijn beiden trekvissen van grote wateren (zee, rivieren). Deze soorten migreren doorgaans door diep en open water. Binnen het soortenbeschermingsregime 'Andere soorten' zijn alleen de vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, beekdonderpad, kwabaal en grote modderkruiper beschermd. Dit zijn soorten van zuurstofrijke, schone en stromende wateren (beekprik, elrits, gestippelde alver, beekdonderpad, kwabaal) of verlandende wateren (grote modderkruiper).

Veldbezoek

Binnen de planlocatie is geen geschikt habitat aanwezig voor onder de Wnb-beschermden vissoorten (zuurstofrijk, schoon stromend water of verlandende wateren, grote rivieren, et cetera). De aanwezige waterlopen zijn smal, rechtgetrokken, eerder nutriëntrijke sloten met een zeer steile en tevens beschoeiende oever en zeer beperkte oevertvegetatie.

Effecten & conclusies

Bij gebrek aan geschikt habitat is het voorkomen van onder de Wnb-beschermden vissoorten binnen de planlocatie uitgesloten. Negatieve effecten op deze soortgroep als gevolg van het voornemen zijn daarmee uitgesloten. Vervolgstappen zijn niet nodig. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht.

5.2.7 Vlinders; libellen en andere ongewervelden

Bureaustudie

Op basis van de NDFF-database zijn in de omgeving van de planlocatie in de afgelopen tien jaar geen waarnemingen bekend van onder de Wnb-beschermden ongewervelden.

Onder de Wnb-beschermden dagvlinders, libellen of andere ongewervelden komen vooral in leefgebieden voor waar hun biotoop nog grotendeels intact is. Dit betreffen veelal zeer specifieke soorten habitats waar de betreffende soort zijn levenscyclus volledig kan doorlopen. De leefgebieden van onder de Wnb-beschermden ongewervelden liggen dan ook vooral binnen en rondom natuurgebieden. Voorbeelden van biotopen waar onder de Wnb-beschermden ongewervelden lokaal kunnen voorkomen zijn droge en schrale kalkgraslanden, vochtige bossen in het oosten van het land en Zuid-Limburg, in blauwgraslanden, kruidrijke heidevelden, vochtige duinvalleien en duingraslanden, kapvlakten in droog en oud eikenbos, wilgenbroekbos in beekdalen, voedselarme tot matig voedselrijke verlandende wateren met een dichte krabbenscheervegetatie (petgaten), hoogveentjes omgeven door bos en gebufferde vennen, en langs zuurstofrijke bovenlopen van beken.

Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van onder de Wnb-beschermden vlinders, libellen of andere ongewervelden. Er is binnen de planlocatie geen geschikt leefgebied aanwezig voor onder de Wnb-beschermden vlinders, libellen of andere ongewervelden. Het ontbreekt er aan schrale vochtige biotopen, moerassen, bosranden en/of bloemrijke graslanden. Ook worden waardplanten van de beschermde soorten dagvlinders (denk bijvoorbeeld aan blauwe knoop en duifkruid (moerasparelmoervlinder), grote pimpinel (donker pimpinelblauwtje), zwenkgras, hondstarwegras en struisriet (zilvestreephooibeestje)), niet gevonden in intensief beheerde akkers en weilanden.

Effecten & conclusies

Door het ontbreken van waarnemingen en de afwezigheid van geschikt habitat binnen de planlocatie, is het voorkomen van beschermde soorten hier uit te sluiten. Hierdoor zijn negatieve effecten van de geplande

werkzaamheden op deze soortgroepen uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig. Wel geldt te allen tijde de zorgplicht.

6

SAMENVATTING

6.1 Effecten op beschermde gebieden

6.1.1 Natura 2000 (Wnb)

Voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase geldt dat significant negatieve effecten (zowel direct als indirect) als gevolg van het voornemen op voorhand zijn uit te sluiten. De goede instandhouding van de aangewezen habitattypen en soorten van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden komen niet in het gedrang. Vervolgstappen in het kader van de Wnb zijn niet nodig.

6.1.2 NNN

Gezien de planlocatie buiten de grenzen van het NNN ligt, en de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Holland geen bepalingen ten aanzien van externe werking bevat, is er geen sprake van directe negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN. Vervolgstappen zijn daardoor niet nodig.

6.2 Effecten op beschermde soorten

In de onderstaande tabel zijn de bevindingen en conclusies ten aanzien van de beschermde soorten samengevat.

Tabel 6.1 Samenvattende tabel

Soortgroep	Beschermde soorten in het plangebied of directe omgeving aanwezig?	Kans op overtreding verboden Wnb?	Gevolgen?	Ontheffing aanvragen Wnb?
flora	nee	nee	geen, wel zorgplicht	nee
grondgebonden zoogdieren	ja, voorkomen van algemeen voorkomende soorten zoals egel, bosmuis en veldmuis is niet uit te sluiten	nee, vrijstelling binnen de provincie Noord-Holland	geen, wel zorgplicht	nee
	ja, voorkomen van de marter, wezel, hermelijn en bunzing is niet uit te sluiten	nee, de planlocatie vormt geen essentieel onderdeel van het leefgebied. Tevens zijn in de omgeving voldoende (beter geschikte) alternatieven aanwezig	geen, wel zorgplicht	nee
vleermuizen	ja, aanwezigheid van (foeragerende) vleermuizen is niet uit te sluiten	nee, de planlocatie vormt geen essentieel onderdeel van het leefgebied. Tevens zijn in de omgeving voldoende (beter geschikte) alternatieven aanwezig	geen, wel zorgplicht in het kader van zorgplicht wordt aanbevolen om werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de actieve periode voor vleermuizen uit te voeren en gebruik te maken van efficiënt lichtbeheer	nee
	ja, binnen gebouw aan het eind van de molentocht is het voorkomen van een paarverblijfplaats van laatvlieger aangetoond	ja, wanneer het betreffende gebouw wordt gesloopt en hierdoor vleermuizen worden verstoord of gedood, en de verblijfplaats wordt vernietigd. Dit zijn overtredingen van respectievelijk artikel 3.5 lid 2, 1 en 4 van de Wnb	verstoring/doden dient te worden voorkomen door het uitvoeren van mitigerende maatregelen (ongeschikt maken van verblijfplaats en periode van sloop aanpassen)	ja, een ontheffing is nodig voor het vernietigen van een verblijfplaats van laatvlieger
vogels	ja, voorkomen van algemeen voorkomende broedvogels (weidevogels) is niet uit te sluiten	ja, indien broedparen als gevolg van de werkzaamheden in de aanlegfase worden verstoord	ja, verstoring van broedparen dient te worden voorkomen. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: - buiten het broedseizoen werken; - de werkzaamheden vlak voor het broedseizoen inzetten en dan continue doorwerken;	nee, mits mitigerende maatregelen in acht worden genomen

Soortgroep	Beschermde soorten in het plangebied of directe omgeving aanwezig?	Kans op overtreding verboden Wnb?	Gevolgen?	Ontheffing aanvragen Wnb?
			– (de omgeving van) de planlocatie voor het broedseizoen ongeschikt maken voor broedvogels. als werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, moet een deskundige vaststellen of er broedende vogels aanwezig zijn in of rondom de planlocatie	
amfibieën & reptielen	na, voorkomen van algemeen voorkomende soorten is niet uit te sluiten	nee, vrijstelling binnen de provincie Noord-Holland	neen, wel zorgplicht	nee
	ja, wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd kan niet worden uitgesloten dat rugstreeppadden de planlocatie betreden	ja, wanneer individuele dieren worden mogelijk verstoord of gedood	ja, verstoring/doding is te voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan: – het plaatsen van paddenschermen; – plaatsen van emmers aan de binnenzijde van het paddenscherm. negatieve effecten op deze soortgroep worden verder gecompenseerd door natuurontwikkeling in de groene gebieden langs het woongebied	nee, mits mitigerende maatregelen in acht worden genomen
vissen	nee	nee	neen, wel zorgplicht	nee
dagvlinders, libellen en overige ongewervelde	nee	nee	neen, wel zorgplicht	nee

6.3 Nodige vervolgstappen

Op basis van deze ecologische quickscan is beoordeeld dat voor de **Sluislocatie** een ontheffingsaanvraag nodig is voor volgende soorten:

- vleermuizen: Laatvlieger.

LITERATUUR

- 1 www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/, geraadpleegd op 3 juni 2019.
- 2 RHO(2016). Weesp -Bloemendalerpolder voormalig grondgebied Muiden - Bijlagen bij de toelichting van het bestemmingsplan, NL.IMRO.0457.BPBloemui-vg01, Rotterdam.
- 3 Provincie Noord-Holland. Kaartenviewer Noord-Holland. <https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapView/>. Geraadpleegd: 3 juni 2019.
- 4 NDFF-ecogrid-database, geraadpleegd op 3 juni 2019.
- 5 www.zoogdierenvereniging.nl, geraadpleegd op 3 juni 2019.
- 6 Janssen, I. & P.J.H. van der Linden (2017) Inventarisatie Bloemendalerpolder te Weesp. Els & Linde b.v.
- 7 www.ravon.nl, geraadpleegd op 3 juni 2019.
- 5 Dietz, Chr., O. von Helversen & D. Nill (2012) Vleermuizen. Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika. Triton Natuur.
- 6 Emond, D. & G.J. Brandjes (2014) Veldonderzoek 2014. Bloemendalerpolder, Weesp. Bureau Waardenburg.
- 7 Hoogeboom, D.M., F. Visbeen, J. Wondergem, W. Ruitenbeek (2014) Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren. NOZOS, Landschap Noord-Holland.
- 8 Janssen, I. & P.J.H. van der Linden (2017) Inventarisatie Bloemendalerpolder te Weesp. Els & Linde b.v.;
- 9 Kaag, K. (2012) Vlinders van Duin tot Dijk. De dagvlinders van Noord-Holland 2000-2009. Vlinderstichting, Landschap Noord-Holland.
- 10 Kapteyn, K. (1995) Vleermuizen in het landschap. Schuyt & co, Haarlem.
- 11 Riet, B. van, H. van der Goes, Th. Baas, C. van den Tempel, W. Menkveld & F. Visbeen (2014) Atlas van de Noord-Hollandse flora. Landschap Noord-Holland.
- 12 Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek & P.J. Zomerdijk (2010) Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009. SVN, Landschap Noord-Holland.
- 13 Simon, M., S. Hüttenbügel & J. Smit-Viergutz (2004) Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Dörfern und Städten. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Bijlage(n)

BIJLAGE: IHD NATURA 2000-GEBIED MARKERMEER & IJMEER

Kernopgaven (2)				
Kernopgaven (1)				
Doelstelling kwaliteit				
Doelstelling oppervlakte				
Landelijke staat van instandhouding				
Habitattypen				
H3140 - Kranswierwateren	-	=	=	4.01,W
H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	-	=	=	

Kernopgaven (3)				
Kernopgaven (2)				
Kernopgaven (1)				
Doelstelling populatie				
Doelstelling kwaliteit leefgebied				
Doelstelling omvang leefgebied				
Landelijke staat van instandhouding				
Habitatsoorten				
H1149 - Kleine modderkruiper	+	=	=	
H1163 - Rivierdonderpad	-	= (>)	= (>)	4.01,W 4.03,W
H1318 - Meervleermuis	-	=	=	

Kernopgaven (2)					
Kernopgaven (1)					
Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)					
Doelstelling kwaliteit leefgebied					
Doelstelling omvang leefgebied					
Landelijke staat van instandhouding					
Broedvogelsoorten					
A017 - Aalscholver	=	=		8000*	
A193 - Visdief	-	=	=	630	

Kernopgaven (2)					
Kernopgaven (1)					
Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)					
Instandhoudingsdoelstelling: Slaap- en rustplaats (s) / foerageergebied (f)					
Doelstelling kwaliteit leefgebied					
Doelstelling omvang leefgebied					
Landelijke staat van instandhouding					
Niet-broedvogelsoorten					
A005 - Fuut	-	=	=	170	4,02
A017 - Aalscholver	+	=	=	2600	
A034 - Lepelaar	+	=	=	2	
A043 - Grauwe Gans	+	=	=	510	4,02
A045 - Brandgans	+	=	=	160	4,02
A050 - Smient	+	=	=	15600	
A051 - Krakeend	+	=	=	90	
A056 - Slobeend	+	=	=	20	4,02
A058 - Krooneend	-	=	=	n.v.t.	
A059 - Tafeleend	--	=	=	3200	4,01, W
A061 - Kuifeend	-	=	=	18800	4,01, W 4,02
A062 - Toppereend	--	=	=	70	
A067 - Brilduiker	+	=	=	170	
A068 - Nonnetje	-	=	=	80	4,01, W
A070 - Grote Zaagbek	--	=	=	40	
A125 - Meerkooit	-	=	=	4500	
A177 - Dwergmeeuw	-	=	=	n.v.t.	
A197 - Zwarte Stern	--	=	=	n.v.t.	

Legenda

Habitattype, soorten, broedvogels en niet-broedvogels	
Landelijke staat van instandhouding	
+	gunstig
-	matig gunstig
--	zeer ongunstig
Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland	
++	groot (> 15%)
+	gemiddeld (2-15%)
-	gering (< 2%)

Habitattypen	
Doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit	
=	behoud
>	uitbreiding
= (>)	uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties
<	vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitattype
= (<)	achteruitgang ten gunste van ander habitattype toegestaan
> (<)	oppervlak staat in principe op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitattype

Soorten, broedvogels, niet-broedvogels	
Doelstelling voor leefgebied en/of omvang populatie	
=	behoud
>	uitbreiding/verbetering
<	vermindering is toegestaan
= (<)	achteruitgang ten gunste van andere soort toegestaan

Broedvogels	
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie	
0	< 2%
+	2-15%
++	15-50%
+++	> 50%

Niet-broedvogels	
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie	
-	0-2%
+	2-15%
++	15-50%
+++	50-100%
x	onvoldoende data
s	betreft slaappleatsfuncties
(s)	betreft nachtelijke slaappleatsen
f	betreft foerageerfuncties op grond van andere dan de reguliere monitoringsgegevens



BIJLAGE: IHD NATURA 2000-GEBIED NAARDERMEER

Kernopgaven (2)						
Kernopgaven (1)						
Doelstelling kwaliteit						
Doelstelling oppervlakte						
Landelijke staat van instandhouding						
Habitattypen						
H3130 - Zwakgebufferde vennen	-	=	=			
H3140 - Kranswierwateren	-	=	=	4,08,W		
H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	-	=	=	4,09,W		
H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	-	=	=	4,09,W	4,15,W	
H6410 - Blauwgraslanden	--	>	>	4,09,W		
H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea)	+	=	=			
H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	-	=	=			
H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	--	>	>			
H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	-	=	=	4,09,W	4,14,W	
H91D0 - *Hoogveenbossen	-	=	>	4,08,W		

Kernopgaven (3)						
Kernopgaven (2)						
Kernopgaven (1)						
Doelstelling populatie						
Doelstelling kwaliteit leefgebied						
Doelstelling omvang leefgebied						
Landelijke staat van instandhouding						
Habitatsoorten						
H1016 - Zeggekorfslak	--	=	=	=		
H1082 - Gestreepte waterroofoever	--	>	>	>	4,08,W	
H1134 - Bittervoorn	-	=	=	=	4,08,W	
H1149 - Kleine modderkruiper	+	=	=	=	4,08,W	
H1903 - Groenknolorchis	--	=	=	=	4,09,W	
H4056 - Platte schijfhoren	-	=	=	=	4,08,W	

Kernopgaven (2)						
Kernopgaven (1)						
Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)				▼		
Doelstelling kwaliteit leefgebied				▼		
Doelstelling omvang leefgebied				▼		
Landelijke staat van instandhouding				▼		
Broedvogelsoorten				▼		
A017 - Aalscholver	+	=	=	1800		
A029 - Purperreiger	--	=	=	60	4.12,W	
A197 - Zwarte Stern	--	>	>	35	4.08,W	
A292 - Snor	--	=	=	30	4.12,W	
A298 - Grote karekiet	--	>	>	10	4.12,W	

Kernopgaven (2)						
Kernopgaven (1)						
Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)				▼		
Instandhoudingsdoelstelling: Slaap- en rustplaats (s) / foerageergebied (f)				▼		
Doelstelling kwaliteit leefgebied				▼		
Doelstelling omvang leefgebied				▼		
Landelijke staat van instandhouding				▼		
Niet-broedvogelsoorten				▼		
A041 - Kolgans	+	=	=	behoud		
A043 - Grauwe Gans	+	=	=	behoud		

Legenda

Habitatype, soorten, broedvogels en niet-broedvogels	
Landelijke staat van instandhouding	
+	gunstig
-	matig gunstig
--	zeer ongunstig
Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland	
++	groot (> 15%)
+	gemiddeld (2-15%)
-	gering (< 2%)

Habitattypen	
Doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit	
=	behoud
>	uitbreiding
= (>)	uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties
<	vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitatype
= (<)	achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan
> (<)	oppervlak staat in principe op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype

Soorten, broedvogels, niet-broedvogels	
Doelstelling voor leefgebied en/of omvang populatie	
=	behoud
>	uitbreiding/verbetering
<	vermindering is toegestaan
= (<)	achteruitgang ten gunste van andere soort toegestaan

Broedvogels	
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie	
0	< 2%
+	2-15%
++	15-50%
+++	> 50%

Niet-broedvogels	
Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie	
-	0-2%
+	2-15%
++	15-50%
+++	50-100%
x	onvoldoende data
s	betreft slaappleatsfuncties
(s)	betreft nachtelijke slaappleatsen
f	betreft foerageerfuncties op grond van andere dan de reguliere monitoringsgegevens



BIJLAGE: IHD NATURA 2000-GEBIED OOSTELIJKE VECHTPLASSEN

Kernopgaven (2)					
Kernopgaven (1)					
Doelstelling kwaliteit					
Doelstelling oppervlakte					
Landelijke staat van instandhouding					
Habitattypen					
H3140 - Kranswierwateren	-	>	>	4,08,W	
H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden	-	>	>	4,09, W	
H4010B - Vochtige heiden (laagveengebied)	-	=	=	4,09, W	4,15,W
H6410 - Blauwgraslanden	--	=	>		
H6430A - Ruigten en zomen (moerasspirea)	+	=	=		
H6430B - Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	-	=	=	4,09, W	
H7140A - Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	--	>	>	4,09, W	
H7140B - Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	-	>	>	4,09, W	
H7210 - *Galigaanmoerassen	-	>	>	4,09, W	
H91D0 - *Hoogveenbossen	-	=	=		

Kernopgaven (3)					
Kernopgaven (2)					
Kernopgaven (1)					
Doelstelling populatie			▼		
Doelstelling kwaliteit leefgebied			▼		
Doelstelling omvang leefgebied			▼		
Landelijke staat van instandhouding			▼		
Habitatsoorten	▼				
H1016 - Zeggekorfslak	--	=	=	=	
H1042 - Gevlekte witsnuitlibel	--	>	>	>	4,08,W
H1082 - Gestreepte waterroofkever	--	>	>	>	4,08,W
H1134 - Bittervoorn	-	=	=	=	4,08,W
H1145 - Grote modderkruiper	-	=	=	=	
H1149 - Kleine modderkruiper	+	=	=	=	4,08,W
H1163 - Rivierdonderpad	-	=	=	=	4,08,W
H1318 - Meervleermuis	-	=	=	=	
H1340 - *Noordse woelmuis	--	>	>	>	4,12,  ,W
H1903 - Groenknolorchis	--	=	=	=	4,09,  ,W
H4056 - Platte schijfhoren	-	=	=	=	4,08,W

Kernopgaven (2)					
Kernopgaven (1)					
Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)			▼		
Doelstelling kwaliteit leefgebied			▼		
Doelstelling omvang leefgebied			▼		
Landelijke staat van instandhouding			▼		
Broedvogelsoorten	▼				
A021 - Roerdomp	--	>	>	5	4,12,  ,W
A022 - Woudaapje	--	>	>	10	
A029 - Purperreiger	--	=	=	50	4,12,  ,W
A119 - Porseleinhoen	--	=	=	8	
A197 - Zwarte Stern	--	>	>	110	4,08,W
A229 - IJsvogel	+	=	=	10	
A292 - Snor	--	=	=	150	4,12,  ,W
A295 - Rietzanger	-	=	=	880	
A298 - Grote karekiet	--	=	=	50	4,12,  ,W

Kernopgaven (2)					
Kernopgaven (1)					
Omvang populatie (indicatief t.b.v. draagkracht leefgebied)					
Instandhoudingsdoelstelling: Slaap- en rustplaats (s) / foerageergebied (f)					
Doelstelling kwaliteit leefgebied					
Doelstelling omvang leefgebied					
Landelijke staat van instandhouding					
Niet-broedvogelsoorten					
A017 - Aalscholver	+	=	=	behoud	
A041 - Kolgans	+	=	=	920	
A043 - Grauwe Gans	+	=	=	1200	
A050 - Smient	+	=	=	2800	
A051 - Krakeend	+	=	=	40	
A056 - Slobeend	+	=	=	80	
A059 - Tafeleend	--	=	=	120	
A068 - Nonnetje	-	=	=	20	

Legenda

Habitatype, soorten, broedvogels en niet-broedvogels	
Landelijke staat van instandhouding	
+	gunstig
-	matig gunstig
--	zeer ongunstig
Relatieve bijdrage van het gebied in Nederland	
++	groot (> 15%)
+	gemiddeld (2-15%)
-	gering (< 2%)

Habitattypen	
Doelstelling voor oppervlakte en/of kwaliteit	
=	behoud
>	uitbreiding
= (>)	uitbreiding met behoud van de goed ontwikkelde locaties
<	vermindering is toegestaan, ten gunste van met name genoemde habitatype
= (<)	achteruitgang ten gunste van ander habitatype toegestaan
> (<)	oppervlak staat in principe op uitbreiding, maar mag achteruit gaan ten gunste van ander habitatype

Soorten, broedvogels, niet-broedvogels

Doelstelling voor leefgebied en/of omvang populatie

=	behoud
>	uitbreiding/verbetering
<	vermindering is toegestaan
= (<)	achteruitgang ten gunste van andere soort toegestaan

Broedvogels

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

0	< 2%
+	2-15%
++	15-50%
+++	>50%

Niet-broedvogels

Relatieve bijdrage van het gebied aan de Nederlandse populatie

-	0-2%
+	2-15%
++	15-50%
+++	50-100%
x	onvoldoende data
s	betreft slaappleatsfuncties
(s)	betreft nachtelijke slaappleatsen
f	betreft foerageerfuncties op grond van andere dan de reguliere monitoringsgegevens

